





Менінгіт та менінгококовий сепсис

5 вагомих причин зробити щеплення

Вакцинація для дітей 11-14 років




З 2023 року спостерігається значне зростання кількості випадків інвазивних менінгококових інфекцій (менінгітів і септицемій), особливо пов'язаних із менінгококами типів W і Y. У зв'язку з можливою серйозністю цих інфекцій вакцинація рекомендується всім підліткам віком від 11 до 14 років.

Що таке інвазивна менінгококова інфекція?

—
У Франції щороку від 500 до 600 осіб хворіють на інвазивну менінгококову інфекцію.

- Це дуже серйозне захворювання, таке як менінгіт або септицемія, яке може призвести до смерті або залишити тяжкі наслідки (глухота, розумова відсталість, ампутація кінцівки тощо).
- Його викликає бактерія менінгокок, яка має кілька типів: A, B, C, W і Y. У Франції найпоширенішими є менінгококи типів B, W і Y.
- Менінгококи — це бактерії, які можуть перебувати в горлі та носі багатьох людей, не викликаючи захворювання. Вони можуть передаватися через тісний, тривалий або повторюваний контакт з інфікованою особою.
- Окрім немовлят, для яких вакцинація є обов'язковою, підлітки та молоді дорослі особливо вразливі до цієї інфекції.
- Наразі доступні безпечні та ефективні вакцини проти менінгококів типів A, C, W і Y.



Кому призначена вакцинація?

Вакцинація проти менінгококів типів А, С, W, Y рекомендується підліткам віком від 11 до 14 років, незалежно від того, чи отримували вони раніше інші вакцини проти менінгококів. Також рекомендовано провести вакцинацію з запізненням (рятувальну вакцинацію) після 14 років — до 24 років включно.

Одного щеплення достатньо, щоб захистити підлітка на щонайменше 5–10 років. Вакцину можна вводити одночасно з іншими щепленнями, рекомендованими для підлітків: бустер проти дифтерії-правцю-коклюшу-поліомієліту, а також вакцина проти вірусу папіломи людини (ВПЛ).

Які вакцини доступні?

Для підлітків можуть бути використані три вакцини: Nimenrix®, Menquadfi® і Menveo®.

Які можливі побічні ефекти?

- Вакцини можуть викликати реакцію в місці ін'єкції (біль, почервоніння, набряк), а також такі симптоми, як підвищена температура, дратівливість або головний біль. Ці реакції є легкими та короткочасними.
- Як і для всіх вакцин, можливі, але вкрай рідкісні, серйозні алергічні реакції.

Скільки коштує вакцина?

Вакцини проти менінгококів А, С, W, Y покриваються на 65 % медичним страхуванням. Решту суми відшкодовують додаткові медичні страхові компанії. Особи, які мають CSS (соціальне медичне страхування) або AME, не сплачують нічого.

Де можна зробити щеплення?

- У коледжі.
- У сімейного лікаря, педіатра, акушерки, медсестри, у аптеці або у центрі вакцинації.

—

Починаючи з початку навчального року 2025, вакцинація проти менінгококів А, С, W, Y буде пропонуватися безкоштовно в школах (колежах) — одночасно з вакциною проти вірусу папіломи людини (ВПЛ).

Питання? Потрібна порада? Проконсульт уйтеся з медичним працівником.

Ефективні вакцини

Дані з країн, де проводиться вакцинація проти інвазивних менінгококових інфекцій типів A, C, W, Y, підтверджують високу ефективність цих вакцин.

Необхідні вакцини

Вони захищають підлітків від менінгітів і септицемій, спричинених менінгококами A, C, W, Y, та запобігають ускладненням, які можуть бути дуже серйозними.

Захищаючи вакцинованих підлітків від зараження і передачі хвороби іншим, вакцинація захищає не лише саму людину, а й її близьке оточення.

Прості вакцини

Одна ін'єкція забезпечує захист до дорослого віку. Вакцину можна вводити одночасно з іншими щепленнями, рекомендованими для підлітків.

Безпечні вакцини

Побічні реакції трапляються рідко і є незначними.

Вакцини, що підлягають відшкодуванню

Медичне страхування покриває 65 % вартості вакцини, а решту — додаткові страхові компанії (mutuelles). У деяких медичних або центрах вакцинації, а також у школах (колежах) вакцинація може проводитися безкоштовно.



VACCINATION
INFO SERVICE.FR

Le site de référence qui répond à vos questions

