



د مینینجایت او د وینې زهري کېدو (سپتیسېمیا) ناروغي
ولې ځان واکسین کړو؟ ۵ مهمې دلیلونه

د ۱۱ څخه تر ۱۴ کلن ماشومانو او ځوانان لپاره واکسین

د مینینګوکوکس او په ځانګړې ډول د W او Y ډولونو بکتريا له امله د خطرناکو ناروغيو (لکه مینینجايټ او سپټيسېميا يا وينې زهري کېدو) پېښې له ۲۰۲۳ کال راهيسې ډېرې شوې دي. د دغو ناروغيو د جدي خطر له امله، سپارښتنه کېږي چې ټول ۱۱ تر ۱۴ کلن ځوانان بايد واکسين شي.

د مینینګوکوکس له امله پېچلې ناروغي څه ته وايي؟

- دا يو ډول سخته ناروغي دي لکه د دماغ پوښونو التهاب (مینینجايټ) يا د وينې زهري کېدل (سپټيسېميا) په توګه وي او کولای شي چې د مرګ يا دايمي معلوليت (لکه کونټيا، ذهني وروسته پاتې والی، يا د لاس يا پښې پرې کول) سبب ګرځي.

- دا ناروغي د يوه مکروبي بکتريا له امله رامنځته کېږي چې "مینینګوکوکس" نومېږي، او دا بکتريا پنځه ډولونه لري: A, B, C, W او Y . په فرانسه کې تر ټولو زيات خپاره ډولونه يې W او Y دي.

- دغه بکتريا اکثره د خلکو په ستوني يا پوزه کې پرته له ناروغي شتون لري، خو کله ناکله د نږدې، اوږدمهاله يا تکراري تماس نور سره نورو ته انتقالېږي.

- سره د دې چې وړوکي ماشومان ته واکسين اړ دي، ځوانان او نوي بالغ کسان هم ډېر له دې ناروغي سره مخ کېږي.

- د مینینګوکوکس A, C, W ، او Y ډولونو پر وړاندې اوس خوندي او اغېزناک واکسينونه شتون لري او خوندي دي.

په فرانسه کې هر کال شاوخوا ۵۰۰ تر ۶۰۰ کسان د مینینګوکوکس له امله د خطرناکو ناروغيو ښکار کېږي.

د واکسين د چا لپاره دي؟

Ad ، C ، W ، Y مينينگوکوکس پر ضد واکسين د ۱۱ تر ۱۴ کلونو ځوانانو لپاره سپارښتنه کېږي، پرته له دې چې مخکې واکسين شوي وي که نه. همداراز، که چاته د دې فرصت نه وي برابر شوی، نو د ۱۴ تر ۲۴ کلونو پورې بيا هم کولای شي واکسين واخلې.

يوه ستنه (واکسين) د ۵ تر ۱۰ کلونو پورې محافظت ورکوي. دا واکسين کولای شي هممهاله د ماشومانو له نورو واکسينونو سره ورکړل شي، لکه د ټيټانوس، شيرې، فلج، او د انساني پاپيلوما وېروس (HPV) پر ضد واکسين.

کوم واکسينونه موجود دي؟

د نوی ځوانانو لپاره درې واکسينونه کارول کېدای شي: Nimenrix®، Menquadfi® et Menveo®

جانبی عوارض يې څه دي؟

- ممکن د سنتي ځای کې لږ درد وکړي او يا سوروالی يا پړسوب رامنځته شي. ځينې کسان کېدای شي لږ تبه، بې حوصله گي يا سردرد احساس کړي.
- لکه نورو واکسينونو غوندې دا نښې نښانې لنډمهاله او بې خطرې وي.

د واکسين بيه څومره ده؟

Ad ، C ، W او Y مينينگوکوکس پر ضد واکسينونه د روغتيا بيمې (AssuranceMaladie) لخوا ۶۵٪ پوښل کېږي. پاتې برخه د تکميلي بيمې (mutuelle) لخوا ورکول کېږي. هغه کسان چې CSS يا AME او يا هم ۱۰۰ فيصده بيمه ولري ، دا واکسين په وړيا توگه ترسره کيږي.

چېرته دا واکسين ترسره کولای شئ؟

- په متوسطه ښوونځي کې
- د کورني (فاميلي) ډاکټر، د ماشومانو ډاکټر، قابلې، نرسانو، درملتون يا د واکسين کولو مرکز کې

له ۲۰۲۵ ښوونيز کال څخه د Ad ، C ، W ، Y مينينگوکوکس پر ضد واکسين له HPV واکسين سره يو ځای به په وړيا ډول په ښوونځي کې ورکول کېږي.

پوښتنه لرئ؟

سلا ته اړتيا

لرئ؟

له يو روغتيايي

کارکوونکي

سره مشوره

وکړئ.

اغېزناک واکسينونه

هغه هېوادونه چې د A، C، W، Y مينينگوکوکس پر ضد واکسينونه کاروي، په څېړنو کې ښودولي دي چې دا واکسينونه ډېر اغېزناک دي.

اړين واکسينونه

دغه واکسينونه ځوانان د مينينجايت او سپټيسېميا له ناروغيو څخه ژغوري، او د هغو خطرناکو عواقبو مخه نيسي چې دا ناروغۍ يې کولای شي ولري.

واکسين نه يوازې هغه ځوان خوندي کوي چې واکسين اخلي، بلکې د کورنۍ او ټولنې نور غړي هم له انتقال څخه ساتي.

ساده واکسينونه

يوه ستنه د ماشومتوب څخه تر ځوانۍ پورې د خونديتوب لپاره کافي دی. دا واکسينونه له نورو واکسينونو سره يو ځای هم ترسره کېدای شي.

بی خطر واکسينونه

د عکس العمل پېښې او جانبي عوارض يې ډېرې لږې وي او خطرناک نه وي.

وړيا يا ارزانه واکسينونه

د روغتيا بيمه د ۶۵٪ پيسې ورکوي، او پاتې برخه تکميلي بيمه ورکوي. په ځينو روغتيايي مرکزونو او ښوونځيو کې واکسين په بشپړ ډول په وړيا توگه ترسره کېږي.



VACCINATION
INFO SERVICE.FR

Le site de référence qui répond à vos questions

