

منتزیت و التهاب خونی ناشی از مننگوکوک

پنج دلیل مهم برای تطبیق واکسین ضد این امراض

واکسیناسیون نوجوانان 11 تا 14 سال

از سال ۲۰۲۳، موارد ابتلا به عفونت های تهاجمی مننگوکوک مانند مننژیت و سپتی سمی (التهاب خونی)، بخصوص موارد مربوط به باکتری مننگوکوک نوع W و Y افزایش چشمگیری داشته است.

با توجه به شدت و خطر بالقوه این نوع عفونت ها، واکسیناسیون برای تمام نوجوانان بین سنین ۱۱ تا ۱۴ سال توصیه می شود.

عفونت تهاجمی مننگوکوک چیست؟

- یک مریضی بسیار جدی مانند مننژیت یا سپتی سمی (التهاب خونی) که می تواند باعث مرگ و یا عواقب ناگوار برای مریض (ناشنوایی، عقب ماندگی ذهنی، قطع عضو و...) گردد.
- این مرض توسط یک باکتری به نام مننگوکوک ایجاد می شود که انواع مختلفی دارد : A، B، C، W و Y. در فرانسه نوع W، B و Y از جمله شایع ترین انواع آن محسوب می شوند.
- باکتری مننگوکوک در گلو و بینی افراد زیادی وجود دارند بدون این که باعث مریضی شوند. این باکتری ها می توانند از طریق تماس نزدیک، مداوم و مکرر با یک شخص مبتلا منتقل شوند.
- بر علاوه نوزادان، که واکسین شدن شان اجباری است، نوجوانان و جوانان بالغ نیز به طور خاص در معرض ابتلا به این مریضی قرار دارند.
- واکسین ضد مننگوکوک های نوع A، C، W و Y در دسترس عموم قرار دارند. این واکسین ها کاملاً مطمئن و بسیار موثر هستند.

در فرانسه، سالانه حدود 500 تا 600 نفر به عفونت تهاجمی مربوط به مننگوکوک مبتلا می شوند.

واکسیناسیون برای چه کسانی است؟

واکسین مننگوکوک نوع C، A، W و Y برای نوجوانان بین 11 تا 14 سال، بدون در نظر داشت نوع واکسین مننگوکوکی که قبلاً دریافت کرده اند، توصیه می شود. این واکسین به شکل جبرانی برای افراد بالای 14 تا 24 سال نیز توصیه می شود.

یک تزریق واکسین نوجوانان را حداقل 5 تا 10 سال از مریضی محافظت می کند. این واکسین می تواند همزمان با دیگر واکسین های نوجوان تطبیق شود : دوز اضافی دیفتی-تتانوس-سیاه سرفه-فلج اطفال، و واکسین ضد ویروس پاپیلوما ی انسانی (HPV).

کدام واکسین ها در دسترس هستند؟

سه نوع واکسین برای نوجوانان قابل دسترسی هستند : **Menquadfi®**، **Nimenrix®** و **Menveo®**

عوارض جانبی واکسین چیست؟

- این واکسین ها ممکن باعث واکنش در نقطه تزریق (درد، سرخی، ورم) و یا علایمی مانند تب، بی قراری، یا سر دردی شود. این علایم موقتی و بدون اهمیت هستند.
- مثل همه واکسین ها، احتمال حساسیت در برابر این واکسین بسیار نادر اما ممکن است.

واکسین چقدر هزینه دارد؟

بیمه تامین اجتماعی 65% هزینه واکسین های ضد مننگوکوک C، A، W و Y را پوشش می دهد. مقدار باقیمانده آن را بیمه های تکمیلی بازپرداخت می کنند. افرادی که از بیمه تکمیلی همبستگی صحت (CSS) و یا کمک طبی دولتی (AME) بهره مند هستند، به صورت رایگان واکسین می شوند.

در کجا واکسین کنیم؟

- در کالج.
- نزد داکتر عمومی، داکتر اطفال، قابله ها، نرس ها، در دواخانه و یا در مرکز واکسیناسیون.

از شروع سال تعلیمی 2025،
واکسین مننگوکوک نوع C، A، W و Y به صورت رایگان و
همزمان با واکسین HPV، در کالج
ها پیشنهاد می شوند.

اگر سوالی داشته باشید و یا نیاز
به مشاوره داشته باشید، می توانید
با یک متخصص صحت
صحبت کنید.

واکسین های موثر

داده های مربوط به کشورهایی که واکسین ضد امراض تهاجمی
مربوط به مننژوکوک های A، C، W و Y را تطبیق می کنند، موثریت
بالای این واکسین ها را تأیید می کنند.

واکسین های ضروری

این واکسین ها نوجوانان را در برابر امراض مننژیت و التهاب خونی
ناشی از مننژوکوک های A، C، W و Y محافظت می کند و از
پیشرفت این امراض که می توانند بسیار شدید باشند، جلوگیری می
کنند.

با جلوگیری از ابتلای نوجوانان به این امراض، واکسیناسیون نه تنها
از خود نوجوانان بلکه از اقارب و نزدیکان آنها نیز محافظت می کند.

واکسین های ساده

فقط یک تزریق برای محافظت از نوجوان تا سن بلوغ کفایت می کند.
این واکسین می تواند همزمان با دیگر واکسین های نوجوان تطبیق
شود.

واکسین های بدون خطر

واکنش در برابر این واکسین ها کم و بدون خطر است.

هزینه واکسین قابل بازپرداخت است

بیمه تامین اجتماعی 65% هزینه واکسین را متقبل می شود و بیمه
تکمیلی باقیمانده آن را بازپرداخت می کند. در بعضی مراکز
واکسیناسیون و در کالج، این واکسین به صورت رایگان تطبیق می
شود.



VACCINATION
INFO SERVICE.FR

Le site de référence qui répond à vos questions

