







COVID-19 : Comprendre les différents tests	 <b>Test PCR</b>		 <b>Test Antigénique</b>	 <b>Autotest</b>
	<b>Prélèvement Salivaire</b>	<b>Prélèvement Nasopharyngé</b>		
<b>Qui peut utiliser ce test ? Dans quel(s) cas ?</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dans le cadre d'un <b>dépistage</b> réalisé auprès d'une collectivité : écoles, collèges, crèches, personnels d'établissements de santé ou médicosocial</li> <li>Dans le cadre du suivi d'un <b>cluster</b> dans ces structures</li> <li>Pour les personnes symptomatiques ou contacts à risque <b>en cas de difficulté à réaliser un prélèvement nasopharyngé</b></li> </ul>	<p><b>Dans tous les cas, dès qu'il y a un doute</b> (personne symptomatique, asymptomatique ou contact à risque)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Les <b>personnes symptomatiques</b> dans un délai inférieur ou égal à 4 jours après l'apparition des symptômes</li> <li>Les personnes asymptomatiques lorsqu'elles sont identifiées comme <b>contact à risque</b> ou que le professionnel réalisant le test l'estime nécessaire</li> <li>Dans le cadre de l'investigation d'un <b>cluster potentiel ou avéré</b></li> <li>Dans le cadre d'une <b>opérations de dépistage collectif</b> organisées au sein de populations ciblées</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Toute <b>personne de plus de 15 ans</b> qui n'est ni symptomatique, ni contact à risque.</li> <li>Dans le cadre d'un dépistage répété une à deux fois par semaine <b>auprès de populations ciblées</b> (lycées et universités, quartiers prioritaires de la ville, etc.)</li> </ul>
<b>Qui réalise le test ?</b>	<p><b>L'utilisateur</b>, sous la responsabilité d'un professionnel ou seul dans le cadre de l'auto-prélèvement à domicile</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Un professionnel habilité</b> : médecin, pharmacien, infirmier, chirurgien-dentiste, sage-femme, masseur-kinésithérapeute</li> <li><b>Un autre professionnel placé sous sa responsabilité</b> : manipulateur d'électroradiologie médicale, technicien de laboratoire médical, préparateur en pharmacie, aide-soignant, auxiliaire de puériculture, ambulancier ou étudiant ayant validé sa première année en médecine, chirurgie dentaire, pharmacie, maïeutique, masso-kinésithérapie ou soins infirmiers, sapeur-pompier ou secouriste d'une AASC titulaire de l'unité d'enseignement premier secours en équipe de niveau 1 ou médiateurs LAC</li> </ul>		<p><b>L'utilisateur</b>, après conseil du professionnel ayant fourni le test et lecture de la notice d'utilisation</p>
<b>Qui analyse le test ?</b>	<p><b>Un biologiste</b> dans un laboratoire d'analyses médicales</p>		<p><b>Un professionnel habilité</b> : médecin, pharmacien, infirmier, chirurgien-dentiste, sage-femme, masseur-kinésithérapeute</p>	<p><b>L'utilisateur</b>, à l'aide de la notice</p>

	 <b>Test PCR</b>		 <b>Test Antigénique</b>	 <b>Autotest</b>
	<b>Prélèvement Salivaire</b>	<b>Prélèvement Nasopharyngé</b>		
<b>Dans quel délai le résultat du test est-il disponible ?</b>	Moins de 48h		Entre 15 et 30 minutes	
<b>À quel point le test est fiable ?</b>	> 80%	Près de 100%	Entre 66% et 74%	Dépend de la qualité de l'auto-prélèvement
<b>Ai-je besoin de refaire un test pour confirmer le résultat ?</b>	Non		Si le test est positif, un test RT-PCR est recommandé pour faire une analyse du variant en cause	En cas de résultat positif, il est obligatoire de faire un <b>test PCR pour confirmer le résultat</b>
<b>Combien coûte le test ?</b>	Gratuit			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gratuit dans le cadre d'opérations de dépistage organisées</li> <li>• Gratuit pour certains professionnels de l'aide à la personne en contact avec des publics fragiles</li> <li>• <b>Entre 5€ et 6€ en moyenne en vente libre</b></li> </ul>

Version mise à jour le 21-05-2021

## En bref

- J'utilise un **Autotest** lorsque je n'ai **pas de symptômes** et que je souhaite **me dépister régulièrement**, notamment quand : je suis étudiant(e) et je rentre chez mes parents le week-end, ou je suis régulièrement en contact avec des personnes vulnérables, ou lorsque je vais retourner au cinéma / théâtre / musée à leur réouverture.

Dans tous les cas, **si le test est positif** : **je m'isole et je confirme avec un test PCR** que je referais au bout de 7 jours. **Si le test est négatif** je continue d'appliquer **les gestes barrières**.

- Je demande un **Test PCR** ou **Antigénique au moindre doute**, notamment quand : j'ai des symptômes correspondants à ceux de la Covid-19, ou j'ai été exposé(e) à une situation à risque, ou je rends visite à un proche vulnérable et fragile, ou je suis cas-contact.