

PRACTICA PROCESULUI DE VACCINARE

Când ar trebui să fie vaccinat copilul meu ?

Vaccinarea copilului de la vârsta de 11 ani garantează o mai mare eficacitate a vaccinului.

Copilul meu are:

- între 11 și 14 ani : sunt necesare doar două doze ;
- între 15 și 19 ani (recuperare) : sunt necesare trei doze.

Bine de știut : profitați de programarea la vaccinare pentru rapelul TcaP*, programată între 11 și 13 ani, pentru a primi, în același timp, și una dintre dozele de vaccin HPV.

*Vaccin contra difteriei (D), tetanosului (T), tusei convulsive (Ca) și poliomelitei (P).

Cum să-mi vaccinez copilul?

Atât în cazul fetelor cât și al băieților este necesar să mă adresez :

- la un medic ;
- la un farmacist ;
- la o moașă ;
- la o asistentă medicală;
- la un serviciu municipal sau departamental de vaccinare (adresați-vă pentru consultații la primăria dumneavoastră sau la consiliul departamental).

Cât costă vaccinarea anti HPV?

- Fiecare doză de vaccin este acoperită în proporție de 65% din fondul dumneavoastră de asigurare de sănătate. Restul se rambursează în general prin asigurări complementare (asigurări mutuale etc.).
- În unele centre de vaccinare, municipale sau departamentale, vaccinarea poate fi gratuită.
- Pentru persoanele care beneficiază de Solidaritate Suplimentară de Sănătate (CSS) și de ajutor medical de stat, acest serviciu este gratuit.

UN VACCIN SIGUR ȘI EFICIENT PENTRU A-MI PROTEJA COPILUL ÎMPOTRIVA INFECTIILOR CU CANCER HPV.

**DACĂ COPILUL DVS. ESTE ȘCOLAR ÎN CLASA A 5-A,
ATUNCI, CU AUTORIZAREA DVS.:**

- El va putea fi vaccinat la școală de către un profesionist din domeniul sănătății;
- El va primi două doze de vaccin, la distanță de cel puțin 6 luni;
- Dvs nu veți achita nimic.

Până în prezent, în aproape 80 de țări, au fost vaccinați peste 100 de milioane de copii și adolescenți.

Pentru mai multe informații,
discutați cu medicul dumneavoastră
sau accesați vaccination-hpv.e-cancer.fr



NICIODATĂ NU SUNT PROTEJAȚI PREA MULT.

VACCINAREA
ÎMPOTRIVA
INFECTIILOR CU
CANCER HPV*,
pentru fete
și băieți
de 11 ani.

GHID PRACTIC

*HPV : Human Papillomavirus sau Papiilomavirus uman.

MĂ INFORMEZ CU PRIVIRE LA VACCINAREA ÎMPOTRIVA INFECȚIILOR CU CANCER HPV

De ce este necesar ca copilul meu să fie vaccinat?

Astăzi, vaccinarea împotriva HPV previne

până la 90% din infecțiile cu HPV care cauzează cancer.

Este recomandat fetelor și băieților împotriva:

- leziunilor precanceroase și/sau cancere ale colului uterin, vulvei, vaginului și anusului;
- leziunilor benigne, dar dureroase, care apar pe piele sau pe mucoase ale anusului și în zona genitală (negi anogenitali).

VACCINARE SIGURĂ ȘI EFICIENTĂ

De mai bine de 10 ani, peste 6 milioane de doze prescrise în Franța, peste 300 de milioane în întreaga lume.

Monitorizare internațională riguroasă.

Utilizarea pe scară largă a vaccinurilor HPV, implementarea supravegherii în multe țări și la nivel internațional și rezultatele unor studii specifice le-au confirmat excelentul profil de siguranță, recunoscut de OMS.

Astfel, de exemplu, nu a fost demonstrată nicio legătură între aceste vaccinuri și bolile autoimune.

Eficacitatea vaccinării împotriva HPV este observată în țările în care numărul adulților tineri vaccinați este mare, cum ar fi în Australia (reducerea cancerelor și a leziunilor precanceroase ale colului uterin și a verucilor anogenitale la bărbați și femei).

MĂ INFORMEZ CU PRIVIRE LA PAPILOMAVIRUSUL UMAN

Ce este HPV?

HPV sunt virusuri umane numite papilomavirusuri. 80% dintre femei și bărbați sunt expuși la acești viruși în timpul vieții. Infecțiile cu HPV dispar de obicei în câteva luni, dar o mică parte poate persista și poate evolua spre boală.

Care este legătura dintre virusurile HPV și cancerul?

Există aproape 200 de tipuri de HPV, dintre care unele provoacă leziuni precanceroase și cancer.

HPV este, de asemenea, responsabil pentru verucile anogenitale.

Cum se transmit virușii HPV?

Acești viruși se transmit prin simplu contact la nivelul organelor genitale, cel mai adesea în timpul actului sexual, cu sau fără penetrare.

ÎN FIECARE AN ÎN FRANȚA, 6.400 DE CAZURI NOI DE CANCER SUNT CAUZATE DE PAPILOMAVIRUSUL UMAN.

În timp ce cancerul HPV afectează în principal femeile, mai mult de un sfert dintre acestea afectează bărbații.

Numărul de boli induse de HPV la femei și bărbați, în Franța, în 2015 (conform lui Shield et al., Hartwig et al., 2015).

	BARBAȚI	FEMEI
Cancerul de penis / Cancerul de vulvă și vaginal	100	200
Cancerul anal	400	1 100
Cancerul orofaringelui (gura, gâtul etc.)	1 300	400
Cancerul de col uterin	—	2 900
Leziuni precanceroase ale vulvei, vaginului, anusului	130	aprox. de la 2500 la 3000
Leziuni precanceroase ale colului uterin (CIN 2+)	—	aprox. 30 000
Veruci anogenitale	aprox. 50 000	aprox. 50 000